fondazione
banfi

VIII Edizione
SUMMER SCHOOL SANGUIS JOVIS

HERITAGE
Frontiera del valore tra terroir e storytelling

Risorse climatiche e viticoltura sostenibile

Prof. Gabriele Cola

Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali

Universita' degli Studi di Milano

fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

AGROECOSISTEMA VITICOLO

L'AGROECOSISTEMA VITICOLO

Geografia + Regimi circolatori

AREALE VITICOLO

A partire dalle condizioni climatiche zonali, il clima locale che caratterizza le aree viticole è il risultato dell'influenza di differenti elementi del paesaggio che variano fortemente nello spazio.

IL TERROIR

CAMBIAMENTO CLIMATICO E TERROIR

L'azione antropica modifica il sistema Atmosfera-Pianta-Suolo con effetti sulla funzionalità del suolo e la sua idoneità per uno specifico uso

Mentre l'uomo può agire direttamente sulla pianta e sul suolo per perseguire l'obiettivo produttivo in campo, il clima e i suoi effetti possono essere affrontati solo in maniera indiretta.

Quando gli effetti dei cambiamenti climatici non possono essere gestiti in modo ordinario, è necessario introdurre nuovi approcci e nuove tecniche (adattamento) per garantire l'espressione del terroir

Approcci e tecniche devono essere sostenibili nel medio e lungo termine

LA SOSTENIBILITÀ

Fonte: economiesuisse, sulla base di Passet (1979)
www.economiesuisse.ch

CONTESTO CLIMATICO

L'ATTUALE FASE CLIMATICA A LIVELLO GLOBALE

TEMPERATURE GLOBALI

L'ATTUALE FASE CLIMATICA

ANOMALIA DELLE PRECIPITAZIONI GLOBALI ANNUE

L'ATTUALE FASE CLIMATICA

TEMPERATURA MEDIA ANNUA [°C] – VARIAZIONE 1991-2020 Vs 1961-1990

L'ATTUALE FASE CLIMATICA

MEDIA PRECIPITAZIONE CUMULATA ANNUE [mm] – VARIAZIONE 1991-2020 Vs 1961-990

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ITALIA – LE TEMPERATURE

Figura 3.8: Serie delle anomalie medie in Italia della temperatura media rispetto al valore normale 1991-2020.

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati SCIA.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ITALIA – EVENTI TERMICI ESTREMI

Giorni di gelo e giorni torridi (anomalia vs 1991-2020)

Giorni con T_{min} < 0°C

Giorni con T_{max} > 35°C

LE GELATE TARDIVE (Aprile-Maggio)

Le gelate sono il risultato di complessi fenomeni che agiscono a diverse scale da quella sinottica circolatoria a quella locale.

La fenomenologia delle gelate tardive non mostra trend significativi.

Fondamentale nel determinare il danno della gelata è la suscettibilità della pianta, funzione dello stadio fenologico della stessa.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ITALIA – LE PRECIPITAZIONI

Figura 5.7: Serie delle anomalie medie in Italia, espresse in valori percentuali, della precipitazione cumulata annuale rispetto al valore normale 1991-2020.

IL CAMBIAMENTO CLIMATICO IN ITALIA – LE PRECIPITAZIONI ESTREME

5000 stazioni sparse sull'intero territorio italiano sul periodo 1915-2015.

Nel 90% delle stazioni si osserva intensità stazionaria, nel 5% in aumento, nel 5% in diminuzione

FREQUENZA

tutti i trend osservati non sono significativi
-> **CLIMA STAZIONARIO**

INTENSITÀ

ASSENZA DI UN CHIARO TREND A LIVELLO NAZIONALE

3. Rain gauges showing significant trend at a 5% significance level for (a) 1-, (b) 3-, (c) 6-, (d) 12-, and (e) 24-hr durations. The background color shows the spatial distribution of the Mann-Kendall test statistic, interpolated using Ordinary Kriging with spherical variogram.

VARIABILI ATMOSFERICHE E VITE

VARIABILITÀ NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DELLE VARIABILI ATMOSFERICHE

EFFETTI ASTRONOMICI ATMOSFERICI E TOPOGRAFICI

Diversi fattori alle diverse scale contribuiscono alla determinazione della temperatura che in ogni momento caratterizza un punto nello spazio

VARIABILITÀ NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DELLE VARIABILI ATMOSFERICHE

INTERCETTAZIONE LUMINOSA DA PARTE DEL FILARE

mezzogiorno solare

pomeriggio

EFFETTO DELL'ORA DEL GIORNO

INTERCETTAZIONE LUMINOSA DA PARTE DEL FILARE

bassa densità

alta densità

EFFETTO DELLA DENSITÀ DELLA CHIOMA

DENSITÀ DELLA CHIOMA E INTERCETTAZIONE DELLA RADIAZIONE

alta densità

bassa densità

LE FORME D'ALLEVAMENTO ED IL LORO RAPPORTO CON LA RADIAZIONE

PERGOLA

TENDONE

ALBERELLO

GUYOT

CORDONE

LYRA

GLI EFFETTI DELLA RADIAZIONE

La radiazione influenza in primo luogo la fotosintesi della pianta e quindi la sua produzione

L'eccesso radiativo può determinare lesioni agli organi della vite - scottature, particolarmente dannose quando riguardano gli acini (qualità delle uve).

Alti livelli radiativi determinano un alto consumo idrico che, in concomitanza con alte temperature e scarsità di precipitazioni può determinare siccità e stress idrico (stress multiplo estivo).

VARIABILITÀ NELLO SPAZIO E NEL TEMPO DELLE VARIABILI ATMOSFERICHE

FRANCIACORTA - Temperature medie giornaliere - 1997-2023

VARIABILITÀ SPAZIALE TEMPERATURA

TEMPERATURA MEDIA ANNUA (1991-2020)

OLTREPÒ PAVESE (2001-2020)

Temperatura minima

Tempertaura massima

EFFETTI DEL RISCALDAMENTO

SPOSTAMENTO LATITUDINALE

SPOSTAMENTO ALTITUDINALE

RISORSE TERMICHE PER LA VITE – INDICE DI WINKLER

Sommatoria termica a base 10 °C calcolata sul periodo

- Emisfero Nord: 1 Aprile – 31 Ottobre
- Emisfero Sud: 1 Ottobre – 30 Aprile

Zone	caratteristiche	Siti	Indici climatici aprile - ottobre	Vitigni di riferimento
1	Temperata fresca	Geisenheim (D), Vienna (A) Dijon (F)	T media < 17.0 °C ΣT attive < 1.390	Sauvignon Pinot n. Chardonnay Gamay
2	Temperata	Bordeaux (F), Napa (USA), Trento (I), Santiago (Cile), Budapest (U)	T media 17.1-18.5 °C ΣT attive 1.390-1.670	Riesling Cabernet franc Cabernet s. Merlot
3	Temperata calda	Montpellier (F) Siena (I)	T media 18.6-20.0 °C ΣT attive 1.670-1.950	Trebbiano Sangiovese Sirah
4	Calda	Perpignan (F), Bari (I), Mendoza (Arg)	T media 20.1-21.5 °C ΣT attive 1.950-2.220	Primitivo Catarratto Nero d'Avola
5	Molto calda	Cadice (E), Atene (Gr) Fresno (U.S.A.), Algeri, Trapani (I)	T media > 21.5 °C ΣT attive > 2.220	Sultanina Tauriga n.

SOMMATORIE TERMICHE	VITIGNI NERI	VITIGNI BIANCHI
1.200 - 1.400	Gamay - Pinot Nero	Chardonnay - Riesling Traminer Aromatico
1.400 - 1.600	Cabernet Franc Cabernet Sauvignon Gamay - Grignolino - Malbec Merlot - Pinot Nero - Cilieggiolo	Albana - Chardonnay - Riesling Pinot Bianco - Sauvignon Trebbiano Toscano
1.600 - 1.800	Cabernet Sauvignon Lambrusco Grasparossa Grignolino - Malbec - Refosco Ruby Cabernet - Sangiovese	Albana - Montuni - Pignoletto Pinot Bianco - Riesling Italoico Sauvignon - Trebbiano Toscano Trebbiano Romagnolo
1.800 - 2.000	Aleatico - Barbera - Nebbiolo Lambrusco di Sorbara Lambrusco Salamino Refosco - Ruby Cabernet Sangiovese	Malvasia Bianca - Montuni Moscato Bianco - Pignoletto Trebbiano Romagnolo

INDICE DI WINKLER IN EUROPA

dato storico

1950-2009

Incremento 2009-1980 Vs 1950-1979

Dalla seconda metà degli anni '80 si osserva in Europa l'incremento del valore medio dell'indice di Winkler per tutti gli areali viticoli

INDICE DI WINKLER IN EUROPA proiezione

Present (1981–2005)

Future projected (2046–2070, RCP8.5)

Le proiezioni climatiche evidenziano un generalizzato incremento dell'indice di Winkler con uno spostamento latitudinale verso Nord delle attuali classi

N.B. – L'indice di Winkler non considera lo stress termico da alte temperature

INDICE DI WINKLER - REIMS E ROVERETO

EFFETTO DELLA TEMPERAURA SULLA VITE – ORE NORMALI DI CALDO

EFFETTI DELLA TEMPERATURA SULLA FENOLOGIA DELLA VITE - CONEGLIANO

EFFETTI SULLA FENOLOGIA DELLA VITE - CONEGLIANO

EFFETTI SULLA FENOLOGIA DELLA VITE – ALSAZIA (Riesling)

EFFETTO DELL'ALTITUDINE SULLA FENOLOGIA DELLA VITE

Appennino di Gubbio (PG)

DECORSO FENOLOGICO - Chardonnay

2023

400 m slm

850 m slm

2024

400 m slm

850 m slm

Germogliamento

Sviluppo vegetativo

Fioritura

Crescita bacca

Maturazione

EFFETTI DELLA TEMPERATURA SULLA MATURAZIONE DELLE UVE

TEMPERATURA DEL GRAPPOLO

Un grappolo esposto alla radiazione solare diretta può raggiungere temperature fino a 10°C superiori a quelle dell'aria, raggiungendo valori assai elevati, ai quali i processi metabolici si interrompono.

Dal punto di vista esclusivamente termico, nella maggior parte dei contesti, la condizione ideale per il grappolo è quella ottenuta con l'ombreggiamento di uno strato fogliare.

LA RISORSA IDRICA - EVAPOTRASPIRAZIONE E BILANCIO IDRICO

L'aumento delle temperature determina una maggiore richiesta evapotraspirativa da parte dell'atmosfera

La vite quindi può muovere più acqua dal suolo verso l'atmosfera

In presenza di acqua nel suolo -> più evapotraspirazione -> più fotosintesi -> più produzione

Quando la disponibilità idrica è limitata -> precoce stress idrico -> Maggiore siccità

EVAPOTRASPIRAZIONE E BILANCIO IDRICO

ITALIA - EVAPOTRASPIRAZIONE MASSIMA Vs REALE (vite)

BILANCIO IDRICO – REIMS Vs ROVERETO

REIMS – STRESS IDRICO

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gen	6	0	0	0	1	0	1	4	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0
Feb	0	0	0	0	0	1	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	0	3	0	4	3	0	0
Mar	2	1	0	0	1	1	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0
Apr	3	2	0	0	5	1	4	6	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mag	0	3	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0
Giu	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	2	5	0	0	0	1	0	2
Lug	3	0	11	1	0	4	0	0	0	0	5	14	0	0	0	0	9	0	1	0	0	12	0	13	3	11	2	2	9	0
Ago	8	1	12	0	22	9	0	8	0	11	15	11	0	0	0	8	11	8	0	0	0	22	0	13	27	16	25	0	24	0
Set	4	1	9	0	12	12	0	4	8	10	19	22	0	4	0	17	0	11	9	2	0	1	4	1	27	26	25	0	18	13
Ott	2	0	3	0	0	0	0	1	11	12	15	18	0	7	6	7	0	16	0	8	0	0	11	0	26	6	0	1	3	10
Nov	0	0	2	0	0	0	0	1	0	8	8	16	0	0	0	0	0	20	0	0	0	1	1	0	9	0	0	0	0	0
Dic	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

ROVERETO – STRESS IDRICO

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gen	2	1	2	1	1	1	0	3	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	4	0	1	0	1	0	0	2	0	1
Feb	0	2	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	1	0	1	2	1	0	0	1	4	1	2	2	0	1	0	1	1	0
Mar	0	1	0	0	0	1	1	3	1	0	2	0	1	0	0	1	0	2	0	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
Apr	0	0	0	8	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
Mag	0	0	7	18	0	0	4	1	1	21	1	0	1	13	0	4	0	19	2	2	0	15	3	0	1	1	2	0	14	0
Giu	13	1	15	15	0	4	11	21	0	23	1	17	17	0	1	19	9	2	12	0	16	17	0	9	0	3	2	11	20	8
Lug	8	7	1	0	1	17	10	16	0	0	18	4	14	5	0	2	19	18	5	9	1	13	0	0	7	11	2	12	23	5
Ago	11	27	0	3	14	9	3	13	1	15	22	2	1	5	0	15	2	14	18	20	2	16	0	0	9	0	2	0	3	0
Set	1	5	0	21	4	6	5	0	0	18	9	4	0	0	0	11	1	9	1	2	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1
Ott	1	0	1	27	2	2	2	0	1	2	4	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	3
Nov	1	3	3	5	0	1	6	0	5	3	2	1	0	1	4	0	5	2	4	3	4	0	2	1	2	7	0	2	2	2
Dic	1	0	2	1	0	1	1	0	1	2	2	1	1	0	4	4	3	1	1	1	2	0	0	2	0	1	3	0	2	2

EFFETTI SU VITE E VINO

EFFETTI DEGLI STESS AMBIENTALI SULLA MATURAZIONE DELLE UVE

- *Blocco del metabolismo primario (zuccheri, acidi, amminoacidi) come conseguenza delle alte temperature e della siccità.*
- *Necrosi dei tessuti, disseccamento, scottatura da alte temperature e alto livello radiativo*
- *Anticipo della maturazione tecnologica (metabolismo primario) come conseguenza delle elevate temperature, così come da condizioni di stress idrico,*
- *Disaccoppiamento della maturazione tecnologica e fenolica - antociani e tannini non maturano nella stessa misura in cui accadrebbe in anni più freschi, caratterizzati da un più lento accumulo zuccherino*
- *Calo sensibile di acido malico e sbilanciamento del rapporto zuccheri-acidità e aroma-acidità per perdita per respirazione causata da temperature notturne elevate*
- *Stress ossidativo causato da stress biotici e abiotici (calore, siccità, eccesso idrico, eccesso radiativo, squilibri nutritivi, salinità), con morte cellulare e necrosi dei tessuti.*

EFFETTI DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO SULLA COMPOSIZIONE DEL VINO

Languedoc

Qualità del vino - Bordeaux

https://www.idealwine.com/it/saga_millesime/table_notation

<https://www.italysfinestwines.it/migliori-annate-vini-bordeaux/>

EFFETTO DELLA ALTITUDINE SULLA MATURAZIONE DELLA VITE

Valtellina

DOY20

TA

In Valtellina, altitudine e temperatura media annua (strettamente dipendente dalla prima) mostrano una forte relazione con la data di raggiungimento del livello zuccherino di 20°Brix (DOY20) e con il livello di acidità totale.

In questo specifico contesto geografico (vallata Est-Ovest, con vigneti prevalentemente esposti a Sud), l'altitudine spiega buona parte della variabilità della maturità tecnologica di Nebbiolo

EFFETTO DELLA ALTITUDINE SULLA MATURAZIONE DELLA VITE

Appennino di Gubbio (PG)

- 400 m slm
- 850 m slm

2023 - Accumulo zuccheri

2024 - Accumulo zuccheri

2023 - Acidità totale

2024 - Acidità totale

ADATTAMENTO

STRATEGIE DI CONTRASTO DEGLI EFFETTI NEGATIVI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Mitigazione - rendere meno gravi gli impatti dei cambiamenti climatici prevenendo o diminuendo l'emissione di gas a effetto serra (GES) nell'atmosfera. La mitigazione si ottiene riducendo le fonti di questi gas (ad esempio mediante l'incremento della quota di energie rinnovabili o la creazione di un sistema di mobilità più pulito) oppure potenziandone lo stoccaggio (ad esempio attraverso l'aumento delle dimensioni delle foreste). In breve, la mitigazione è un intervento umano che riduce le fonti delle emissioni di gas a effetto serra e/o rafforza i sink di assorbimento.

In ambito viticolo questo si traduce nell'adozione di pratiche/azioni a basso impatto lungo tutta la filiera produttiva: dalla realizzazione del vigneto, alla sua gestione, al trasferimento delle uve in cantina, alla loro trasformazione, fino alla commercializzazione.

Adattamento - adottare misure adeguate per prevenire o ridurre al minimo i danni che possono essere causati dagli effetti avversi dei cambiamenti climatici / sfruttare le opportunità positive che questi possono determinare.

STRATEGIE DI ADATTAMENTO il processo decisionale in vigneto

Spazio

Tempo

ADATTAMENTO

Adattamento iterativo

Fattori decisionali

Feedback

VARIAZIONI CLIMATICHE DI BREVE TERMINE

OBIETTIVO PRODOTTO FINALE

STRATEGIE DI ADATTAMENTO

ADATTAMENTO ALLE ALTE TEMPERATURE

- riduzione del rapporto fra area fogliare/carico produttivo
- potatura invernale tardiva
- aumento dell'altezza del tronco
- cambio della forma d'allevamento
- cloni tardivi
- portinnesti con effetto ritardante
- adozione di varietà tardive
- spostamento ad altitudine superiore

ADATTAMENTO ALLO STRESS IDRICO

- adozione di portinnesti resistenti/tolleranti allo stress idrico
- adozione di varietà resistenti/tolleranti allo stress idrico
- cambio della forma d'allevamento
- irrigazione
- gestione del suolo
- inerbimenti controllati

Esempi di gestione degli stress termici e idrici

TELI OMBREGGIANTI

IRRIGAZIONE MULTIFUNZIONE

APPLICAZIONE CAOLINO

STRATEGIE DI ADATTAMENTO E RICERCA SCIENTIFICA

FIGURE 3 | Number of studies that evaluate each adaptation lever. The size of the circles is proportional to the number of studies evaluating the levers. The number of studies appears in brackets for the main categories. One study can appear several times, as it may evaluate several adaptations.

ADATTAMENTO

Irrigazione multifunzionale

Irrigazione di soccorso

Schermatura dalla radiazione

Gestione del suolo

Gestione della chioma

Difesa

Gestione della vendemmia

ADATTAMENTO

BREVE

MEDIO

LUNGO

RESILIENZA

Selezione del sito

Orientamento filari

Portinnesto

Varietà

Forma d'allevamento

PRIORITÀ

STRATEGIE DI ADATTAMENTO E SOSTENIBILITÀ

- I cambiamenti climatici determinano variazioni nelle variabili guida degli ecosistemi e degli agroecosistemi
- Le variazioni possono avere effetti positivi o negativi a seconda dell'ambiente e dell'obiettivo produttivo
- L'adattamento di un processo produttivo alle nuove condizioni si ottiene attraverso mirate e specifiche strategie
- Non esistono strategie vincenti a priori – ogni strategia va calata nello specifico contesto ambientale – verificando la stabilità dei cambiamenti osservati
- È fondamentale valutare le esternalità positive e negative di ogni azione adottata – una misura di adattamento potrebbe essere efficace ma non sostenibile

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

fondazione banfi

SANGUIS JOVIS
ALTA SCUOLA DEL SANGIOVESE

fondazionebanfi.it